

子どもの定期予防接種のお知らせ

法律で定められた予防接種です。必ず受けましょう！



ー接種医療機関ー

【町内】鰐ヶ沢病院 ☎72-3111 越前医院 ☎72-5151 あじがさわクリニック ☎72-5200 セツ石内科 ☎72-2879
 【町外】青森県内広域予防接種協力医療機関

※標準的な接種年齢とは…病気になりやすい時期を考慮して定めているものです。できるだけ、この期間の早い時期に受けましょう。

◎個別接種になりますので、医療機関に電話予約が必要です。

◎接種当日は、母子健康手帳と予防接種予診票をご持参ください。

◎町外の医療機関での接種を希望される方は、事前に役場ほけん福祉課・健康推進班までご連絡ください。

(料金/無料)

| 種類 | 対象年齢 | | 接種間隔、回数 |
|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ヒブ ※1回目の接種年齢により接種回数が異なります。 | 生後2か月～5歳の誕生日前日まで | 初回接種開始時期 | 生後2～7か月になる前日まで 初回3回 27日以上（標準的には20～56日）の間隔をあけて3回、1歳の誕生日前日までに 追加1回 初回終了後7か月以上（標準的には7～13か月）の間隔をあけて行う |
| | | 生後7～12か月になる前日まで | 初回2回 27日以上（標準的には20～56日）の間隔をあけて2回、1歳の誕生日前日までに 追加1回 初回終了後7か月以上（標準的には7～13か月）の間隔をあけて行う |
| | | 生後1～5歳の誕生日前日まで | 1回 |
| 小児用肺炎球菌 ※1回目の接種年齢により接種回数が異なります。 | 生後2か月～5歳の誕生日前日まで | 初回接種開始時期 | 生後2～7か月になる前日まで 初回3回 27日以上の間隔をあけて3回、2歳の誕生日前日までに 追加1回 初回終了後、60日以上の間隔をあけて1歳以降に行う |
| | | 生後7～12か月になる前日まで | 初回2回 27日以上の間隔をあけて2回、2歳の誕生日前日までに 追加1回 初回終了後、60日以上の間隔をあけて、1歳以降に行う |
| | | 1～2歳の誕生日前日まで | 2回 60日以上の間隔をあけて行う |
| | | 2～5歳の誕生日前日まで | 1回 |
| B型肝炎 | 1歳の誕生日の前日まで | | 3回 27日以上の間隔をあけて2回。3回目は1回目から139日以上の間隔をあけて行う (※標準的な接種年齢は、生後2～9か月になる前日まで) |
| 四種混合 (ジフテリア 百日せき 破傷風 不活化ポリオ) | 生後3か月～7歳6か月になる前日まで | | 初回3回 20日以上（標準的には20～56日）の間隔をあけて3回 (※標準的な接種年齢は、生後3～12か月になる前日まで) 追加1回 1期初回終了後6か月以上（標準的には12～18か月）の間隔をあけて1回 |
| BCG（結核） | 1歳の誕生日前日まで | | 1回（※標準的な接種時期は、生後5～8か月になる前日まで） |
| 麻しん風しん (MR) 混合 | 【1期】 1歳～2歳の誕生日前日まで | | 1回 |
| | 【2期】 小学校入学前の1年間 | | 1回 |
| 水痘 | 1～3歳の誕生日前日まで | | 2回 初回終了後3か月以上（標準的には6～12か月）の間隔をあけて行う (※標準的な初回接種時期は、生後12～15か月になる前日まで) |
| 日本脳炎 | 【1期】 生後6か月～7歳6か月になる前日まで | 初回2回 6日以上（標準的には6～28日）の間隔をあけて行う。 (※標準的な接種年齢は3～4歳の誕生日前日まで) | |
| | | 追加1回 初回終了後、6か月以上（標準的には1期初回終了後、おおむね1年）の間隔をあける (※標準的な接種年齢は4～5歳の誕生日の前日まで) | |
| | 【2期】 9歳～13歳の誕生日前日まで | 1回 (※標準的な9～10歳の誕生日前日に行う 小学校3年生頃) | |
| 二種混合 (ジフテリア・破傷風) | 11歳～13歳の誕生日前日まで | | 1回 (※標準的な接種年齢は11～12歳の誕生日前日に行う 小学校6年生頃) |

≪予防接種の接種間隔に注意しましょう！≫

★生ワクチン…BCG、麻しん風しん、水痘、ロタウイルス、おたふくかぜ等 ⇨ 接種翌日から27日以上あける

★不活化ワクチン…ヒブ、小児肺炎球菌、B型肝炎、四種混合、日本脳炎、二種混合、インフルエンザ等 ⇨ 接種翌日から6日以上あける

【問】鰐ヶ沢町役場 ほけん福祉課・健康推進班（☎72-2111）