子どもの定期予防接種のお知らせ

法律で定められた予防接種です。必ず受けましょう!

R5.4月

一接種医療機関-

[町内]鰺ヶ沢病院 ☎72-3111 越前医院 ☎72-5151 あじがさわクリニック ☎72-5200 七ツ石内科 ☎72-2879 [町外]青森県内広域予防接種協力医療機関

- ※標準的な接種年齢とは…病気になりやすい時期を考慮して定めているものです。できるだけ、この期間の早い時期に受けましょう。
 - ◎個別接種になりますので、医療機関に電話予約が必要です。
 - ◎接種当日は、母子健康手帳と予防接種予診票をご持参ください。
 - ◎町外の医療機関での接種を希望される方は、事前に役場ほけん福祉課・健康推進班までご連絡ください。

(料金/無料)

◎町外の医療機関での接種を希望される方は、事前				望される方は、 争削	に役場ほけん福祉課・健康推進班までご連絡ください。
種類	対象年齢			手齢	接種間隔、回数
ヒブ	生後2か月 〜5歳の誕 生日前日ま で		初回接種開始時期	生後 2~7 か月に なる前日まで	初回3回 標準的には27日(医師が必要と認めたときは20日)~56日 の間隔をあけて3回、1歳の誕生日前日までに行う 追加1回 初回終了後7か月以上(標準的には7~13か月)の間隔をあけて行う
※1回目の接種年齢 により接種回数が 異なります。				生後 7~12 か月 になる前日まで 生後 1~5 歳の誕 生日前日まで	初回 2 回 標準的には 27 日(医師が必要と認めたときは 20 日) ~56 日 の間隔をあけて 2 回、1 歳の誕生日前日までに行う 追加 1 回 初回終了後 7 か月以上(標準的には 7~13 か月)の間隔をあけて行う 1 回
小児用肺炎球菌	生後 2 か月 〜5歳の誕生 日前日まで		初回接種	生後 2~7 か月に なる前日まで 生後 7~12 か月 になる前日まで	初回 3回 27日以上の間隔をあけて3回、2歳の誕生日前日までに行う 追加 1回 初回終了後、60日以上の間隔をあけて1歳以降に行う 初回 2回 27日以上の間隔をあけて2回、2歳の誕生日前日までに行う。 追加 1回 初回終了後、60日以上の間隔をあけて、1歳以降に行う
※1回目の接種年齢 により接種回数が			開始	1~2 歳の誕生日 前日まで	2回 60日以上の間隔をあけて行う
異なります。			時 期	2~5 歳の誕生日 前日まで	1 🖸
ロタウイルス	初回 接種	ロタリックス(1 価) 生後 2 か月から出生 14 週 6 日 まで			2 回接種 (27 日以上の間隔をあける) 出生 6 週から 24 週までに 2 回接種
	開始 時期	ロタテ 生後 2 まで		(5 価) いら出生 14 週 6 日	3 回接種 (27 日以上の間隔をあける) 出生 6 週から 32 週までに 3 回接種
B型肝炎	1歳の誕生日の前日まで			まで	3 回 27 日以上の間隔をあけて 2 回。3 回目は 1 回目から 139 日以上の間隔をあけて行う (※標準的な接種年齢は、生後 2~9 か月になる前日まで)
四種混合 ジフテリア 百日せき 破傷風 不活化ポリオ	生後 2 か月~7 歳 6 か月になる前日ま で			か月になる前日ま	初回3回 20日以上(標準的には20~56日)の間隔をあけて3回 (※標準的な接種年齢は、生後2~12か月になる前日まで) 追加1回 1期初回終了後6か月以上(標準的には12~18か月)の間隔をあけて1回
BCG (結核)	1歳の誕生日前日まで			С	1回 (※標準的な接種時期は、生後 5~8 か月になる前日まで)
麻しん風しん	【1期】1歳~2歳の誕生日前日まで			誕生日前日まで	1 🛽
(MR)混合	【2期】小学校入学前の1年間				1 回
水痘	1~3歳の誕生日前日まで			まで	2回 初回終了後3か月以上(標準的には6~12か月)の間隔をあけて行う (※標準的な初回接種時期は、生後12~15か月になる前日まで)
日本脳炎 ★特例について 詳しくは裏面を	【1 期】 生後 6 か月~7 歳 6 か月になる前日まで 【2 期】9 歳~13 歳の誕生日前日まで				初回2回 6日以上(標準的には6~28日)の間隔をあけて行う。 (※標準的な接種年齢は3~4歳の誕生日前日まで) 追加1回 初回終了後、6か月以上(標準的には1期初回終了後、おおむね1年)の間隔をあける (※標準的な接種年齢は4~5歳の誕生日の前日まで) 1回(※標準的な接種年齢は9~10歳の誕生日前日まで)
ご覧ください	【 特例 】 • 平成 7 年 4 月 2 日~平成 19 年				「回 (※保学的な技程中断は 9~10 歳の誕生日前日まで) 年 4 月 1 日生まれの 20 歳未満の方 1 年 10 月 1 日生まれで 7 歳 6 か月までに 1 期が終わらなかった方
二種混合 (ジフテリア・破傷風)	11 歳~13 歳の誕生日前日まで				1 回
子宮頸がん (ヒトパピローマ ウイルス)	小学6年生(12歳)~高校1年生(16歳) の女子 (12歳となる年度の初日から16歳となる年度の末日までの間にある女子))初日から 16 歳と	3 回接種 ● サーハ・リックス (2 価ワクチン) 1 か月の間隔をあけて 2 回接種後、1 回目から 6 か月の間隔をあけて 3 回目接種 3 回接種 ● カ・ータ・シル (4 価ワクチン) 2 か月の間隔をあけて 2 回接種後、1 回目から 6 か月の間隔をあけて 3 回目を接種
★越前医院は実施していません	【特例】平成9年4月2日~ 平成19年4月1日生まれの女子 ★詳しくは裏面をご覧ください。			1日生まれの女子	2 回または3回接種●シルガード9 (9 価ワクチン) 1 回目の接種が15 歳未満:1 回目から6か月の間隔をあけて2回接種 1 回目の接種が15 歳以上:2 か月の間隔をあけて2回接種後、1 回目から6か月の間隔をあけて3回目接種